



Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Regionen i samråd med smittskyddsläkare har alltid möjlighet att göra anpassningar utifrån hur situationen ser ut regionalt.

För definition av bekräftat fall av covid-19 hänvisas till [falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen](#).

Indikation för provtagning

Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom tre månader från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, men kan göras utifrån individuell bedömning av behandlande läkare, alternativt utifrån regionala riktlinjer. Kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp till flera månader efter genomgången infektion, vilket bör beaktas vid bedömningen.

Provtagning rekommenderas:

- vid symtom på covid-19 hos
 - personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning
 - personal och patienter inom hälso- och sjukvård
 - personal och omsorgstagare inom omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas
- vid smittspårning, se [Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg](#) för detaljer
- enligt regionala/lokala rekommendationer avseende screening av hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och omsorgspersonal samt omsorgstagare inom verksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas

Omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas

Följande, och liknande, omsorgsverksamheter ingår

- särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor (SÄBO)
- hemtjänsten
- dagverksamheter
- verksamheter under lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)